



LỊCH GIEO HẠT CÀ TÍM VÀ CÀ CHUA ĐỂ GHÉP

I. Thời vụ ghép.

Cà tím là cây ưa nhiệt độ ẩm áp, hàng năm có thể gieo hạt từ tháng ba đến tháng mười một, nếu muốn trồng cà chua ghép để có quả vào tháng hai đến tháng năm thì tứ tháng mười một đã phải có cà tím để ghép, trồng cà chua ghép vào đầu tháng mười hai.

Nhiệt độ thích hợp cho cà tím nảy mầm từ 18⁰c đến 30⁰c, nếu nhiệt độ dưới 15⁰ c không nên gieo cà tím, vì hạt khó nảy mầm, cây sinh trưởng kém.

Nhiệt độ thích hợp cho cà chua nảy mầm từ 15⁰c đến 30⁰c, nếu nhiệt độ dưới 10⁰c không nên gieo hạt.

II. Các điều kiện ngoại cảnh.

Nhiệt độ thích hợp để ghép cà chua lên gốc cà tím từ 20⁰c đến 30⁰c, với điều kiện ngày và đêm không quá chênh lệch. Nếu ghép vào ngày nhiệt độ 15⁰c, có gió bắc, vết ghép mau khô nhựa, cây cà tím sinh trưởng chậm, vết thương lâu lành, tỉ lệ cây chết nhiều.

Nếu ghép vào ngày nóng trên 30⁰c, nếu không chú ý giữ ẩm cho cây, ngọn cà chua mau bị héo, vết thương khó phục hồi, tỉ lệ cây chết tăng.

III. Lịch gieo hạt, chăm sóc cà tím và cà chua.

1. Gieo hạt cà tím.

-*Ngày thứ nhất* : trộn 6 phần đất, 3 phần phân chuồng và 1 phần tro bếp, mỗi 1m³ hỗn hợp trộn thêm 5 kg lân supe, cho hỗn hợp vào lỗ của khay, gạt phẳng, gieo 2 hạt cà một lỗ, lấp 0,2 cm đất, sau đó phủ lớp trấu, tưới giữ ẩm trong 5 ngày thì hạt mọc. sau khi gieo và tưới xong rắc thuốc Vicarpen phòng chống kiến tha hạt. Trong năm ngày đó theo dõi không để chuột ăn hạt.

-*Ngày thứ sáu* : Lúc này cây có 2 lá mầm, giai đoạn này tưới giữ ẩm, theo dõi sâu xám cắn cây con, rắc thuốc tiếp nếu có sâu.

-*Ngày thứ mười* : Lúc này cây có 2 lá thật, giai đoạn này trở đi cây dễ bị chết thối ở gốc do đất ẩm và chặt quá, vì vậy cần tưới đủ ẩm, đất trộn phải tơi xốp. nếu có hiện tượng chết thối, hoà 10 gr Benlát, hoặc oxit đồng(1 gói cho 1 bình 10 lít) tưới vào gốc cây con. Khi cây có 3 lá thật nếu thấy lỗ nào không có cây thì bứng cây từ lỗ có 2- 3 cây dặm vào đó.

-*Ngày thứ chín* : Gieo hạt cà chua, 2 hạt một lỗ, lấp 0,2 cm đất, phủ trấu, tưới giữ ẩm trong 4- 5 ngày thì hạt mọc 2 lá mầm.

-*Ngày thứ 11 đến ngày thứ 30* : cây tiếp tục ra lá thật thứ 3, 4, 5, trong giai đoạn này cần theo dõi sâu xám cắn ngọn, sâu xanh cắn lá thì phun Regent diệt trừ. Nếu phát hiện bọ phấn cần phun Selecron diệt ngay. Khi cây có 4- 5 lá thật, đường kính thân đủ 2- 3 mm thì tiến hành ghép.

2. **Chăm sóc cà chua:** tiến hành như chăm sóc cà tím, theo dõi bọ phấn thường xuyên để diệt kịp thời. khi cây có 4- 5 lá thật, đường kính thân đủ 2- 3 mm thì cắt ngọn để ghép.